



- 01** 수술 후 7일 동안은 부기나 멍이 생기며 그 이후부터는 점차 빠지게 됩니다.
- 02** 수술 후 7일 정도는 냉찜질을 해주는 것이 좋습니다. 냉찜질을 하실 때에는 눈 위에 얇은 수건이나 손수건을 먼저 댄 후, 코가 시작하는 부분 근처와 눈 주위로 하시고 콧등과 코 끝 부위는 피하셔야 합니다.
- 03** 실밥을 제거한 다음 날부터 세수와 메이크업이 가능합니다.
- 04** 코 수술 후에 붙인 반창고나 깁스, 코 안에 넣은 솜 등은 임의로 절대 떼거나 제거하시면 안됩니다.
- 05** 수술 후 3개월 정도는 코를 풀지 않으셔야 합니다. 콧물이나 피가 나올 경우 콧구멍 안으로 깊이 휴지를 넣지 마시고 콧구멍 근처에서 가볍게 닦아 내시면 됩니다. 수술 후 2~3일 정도는 약간의 피가 비치거나 진물처럼 나올 수 있습니다.
- 06** 용비술을 시행한 경우에는 수술 후 4주, 절골술을 시행한 경우에는 수술 후 6주 동안은 안경이나 선글라스를 착용하시면 안됩니다.
- 07** 가벼운 산책을 제외한 에어로빅, 헬스 등의 강한 운동은 수술 후 4주가 경과한 후부터 하시는 것이 좋습니다.
- 08** 수술 부위를 제외한 간단한 샤워는 수술한 다음 날부터 가능하지만, 수술 부위에 물이 닿지 않게 주의하고, 목욕탕, 찜질방, 사우나 등은 수술 후 4주가 경과한 후부터 이용하셔야 합니다.
- 09** 고개를 숙이거나 엎드리는 행동은 금하여 주셔야 합니다.
- 10** 주무실 때는 폭신한 베개를 받쳐서 주무시는 것이 부기나 통증을 빨리 가라앉게 하는데 도움이 되며 베개에 목이 꺾이지 않도록 주의하셔야 합니다. 목을 옆으로 돌리거나 엎드려 주무시지 마시고 가능한 반듯하게 누워 주무시기 바랍니다.
- 11** 진통제나 항생제는 병원에서 처방한 것만 드시면 됩니다. 진통제가 추가로 필요한 경우에는 아스피린 성분이 없는 타이레놀을 드시면 됩니다. 진통제 중 아스피린 계통은 출혈을 일으킬 수 있으므로 드시지 않아야 합니다.
- 12** 술과 담배는 반드시 수술 후 4주가 경과한 후부터 하셔야 합니다. 술은 염증을 유발할 수 있으며, 담배는 혈관을 수축시켜 피부를 손상 및 괴사시키거나 수술 부위의 상처 치유를 매우 지연시킬 수 있습니다.
- 13** 퇴원 후 발생하는 궁금하신 사항이나 혹은 긴급상황이 발생할 경우 병원(TEL 1588-5153)으로 직접 전화 주시기 바랍니다.